



Contexte

Le 26 novembre 2021, un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) de souche H5N1 a été détecté en élevage dans le département du Nord (59), signifiant la perte du statut indemne que la France avait recouvré le 2 septembre 2021 conformément au chapitre 10.4 du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'OIE.

Situation sanitaire

Pour tous les foyers, dès le stade de la suspicion, les mesures de gestion sanitaire ont été déclenchées avec mise en place du zonage réglementé (3 et 10km) autour des élevages concernés, renforcement des mesures de biosécurité, recensement des élevages et interdiction des mouvements de volailles dans les zones réglementées.

- **10 FOYERS en élevage hors Sud-Ouest : 8 foyers dans le département du Nord (59), deux foyers dans le département de la Vendée (85)**

Département du Nord (59)

Le département compte au total 8 foyers H5N1 dans une seule et unique zone, le dernier détecté le 20 décembre 2021, tous notifiés à l'OIE conformément aux dispositions du chapitre 1.1 du Code sanitaire pour les animaux terrestres. Un dépeuplement préventif complémentaire dans les élevages sains a été réalisé dans un rayon de 1 à 3 km.

L'enquête épidémiologique privilégie le lien avec la faune sauvage dans une région reconnue pour héberger des espèces migratrices (présence de zones humides).

L'absence de nouveau foyer depuis le 20 décembre 2021 (soit depuis plus de 4 semaines) montre l'efficacité des mesures sanitaires mises en place ainsi que la stabilisation de la situation sanitaire dans ce département. Seul un foyer n'est pas clôturé dans les rapports OIE.

Département de la Vendée (85)

Deux foyers ont été détectés les 2 et 10 janvier 2022, aussitôt dépeuplés. Les investigations épidémiologiques privilégient des contacts avec l'avifaune comme source de contamination.


- **241 FOYERS en élevage dans LE SUD-OUEST dans 5 départements : Gers (32), Landes (40), Lot-et-Garonne (47), Hautes-Pyrénées (65) et Pyrénées-Atlantiques (64)**

Depuis le 16 décembre 2021, 241 foyers d'IAHP H5N1 ont été déclarés dans le Sud-Ouest, dont environ 70% dans le département des Landes et 20% dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Même s'il s'agit de la même souche H5N1, ces foyers n'ont pas de lien épidémiologique direct avec les foyers du

département du Nord (59) et de la Vendée (85). Là encore ils sont localisés à proximité de zones humides attirant les oiseaux sauvages sur leur trajectoire de migration.

Les premiers résultats des enquêtes épidémiologiques et des analyses des souches de virus détectés tendent par ailleurs à montrer que le Sud-Ouest a été soumis à plusieurs introductions concomitantes et que le virus s'est ensuite propagé d'élevage en élevage.

Pour réduire la durée de l'épizootie et à prévenir son extension vers d'autres zones de production aujourd'hui indemnes, les autorités sanitaires ont pris la décision d'organiser un dépeuplement préventif accéléré (qui concernera près d'un million d'oiseaux, à l'exception des reproducteurs) et en parallèle un vide sanitaire (interdiction temporaire de repeuplement des élevages) pour toutes les volailles et palmipèdes dans le périmètre englobant les foyers actifs des départements des Landes (40), des Pyrénées-Atlantiques (64) et du Gers (32). Ce périmètre pourra évoluer en fonction de l'évolution sanitaire.



Zones réglementées liées aux foyers et cas sauvages IAHP dans le Sud-Ouest

